

INVENTAIRE HEBDOMADAIRE DU CHARIOT D'URGENCES




Remise à jour le 5 Mars 2002

Ce guide a été réalisé dans le but que tous, collègues, nous sachions nous repérer avec l'organisation du chariot d'urgence et que nous ayons tous, la même manière de procéder à la vérification du chariot d'urgences.

Dans un premier temps il est primordial et médico-légal de vérifier la charge du défibrillateur, une feuille est prévue à cet effet pour noter que la vérification a bien été faite. Rappelons qu'en cas de défaillance de celui-ci, s'il n'a pas été testé, c'est votre responsabilité qui est engagée.

Présentation du chariot



REANIMATION RESPIRATOIRE

PLATEAU D'INTUBATION :

Il se trouve dans le deuxième tiroir.

Il doit contenir.

- 1 laryngoscope
- 3 lames (n°2- n°3- n°4)
- 1 pince de Magill adulte
- 3 canules de Guedel (taille 3, 4 et 5)
- 2 Mandrins
- 1 sonde d'intubation n°5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5
(1 de chaque)
- 1 seringue de 10 ml
- Piles et ampoules de rechange pour le laryngoscope

- Gants stériles n°6,5-7,5-8-8,5-9
- Xylocaïne 5% : 1 flacon
- Xylocaïne visqueuse : 1 tube

- 1 rouleau de sparadrap
- une moustache élasto
- 1 spray de Silisonde

TRACHEOTOMIE :

- 1 Tracheoquick adulte
- 1 canule de trachéotomie à ballonnet basse pression



VERIFIER TOUJOURS LE FONCTIONNEMENT DU LARYNGOSCOPE

ASPIRATION :

Sondes d'aspiration bronchique CH 12-14-16 (2 de chaque) dans le carton côté droit du chariot

Raccords biconiques

Sondes d'aspiration digestives

Seringues gros embout

3^e tiroir côté gauche

VERIFIER TOUJOURS LE BON FONCTIONNEMENT DU SYSTEME D'ASPIRATION

VENTILATION / OXYGENATION :

Sur le côté gauche du chariot


AMBU O² + 2 masques adultes

Raccord à O²

Sondes à oxygène CH 10-12-14 (1 de chaque)

1 attache patient + 1 autre composée de 2 américains et une bande de 10 cm

1 stéthoscope sur le pied à perfusion



REANIMATION CARDIO-CIRCULATOIRE

PLATEAU PERFUSION / BILAN :

Il se trouve dans l'avant dernier casier

5 cathlons 16-18-20-22-24 G (*1 de chaque*)
1 garrot
2 sachets de compresses stériles
1 dermafilm
1 système vacutainer
1 tube labo de chaque couleur
1 lueur adapter
1 aiguille à prélèvement 20G + 1 de 22G
1 glucosé à 5% 500 ml- 1 sérum physiologique 500 ml
1 tubulure à perfusion avec robinet
1 albuplast
1 pipette d'hibidil
1 seringue à gaz du sang

SOLUTES DE PERFUSION :

Ils se trouvent dans les rangements inférieurs

2 Glucosé à 5% 500 ml	3 tubulures à perfusion avec et sans robinets
1 Glucosé à 10% 500 ml	1 rampe et 5 robinets
1 Glucosé à 5% 100 ml	2 prolongateurs à SAP
2 Nacl 0,9% 500 ml	1 prolongateur + 1 robinet (0,1m)
2 Nacl 0,9% 100 ml	3 ampoules 20 ml EPPI
1 Bicarbonate de Sodium 1,4% 500 ml	3 ampoules 10 ml EPPI
1 Bicarbonate de Sodium 4,2% 500 ml	3 ampoules 10 ml Nacl 0,9%
1 Elohes 500 ml	10 paquets de compresses
2 Plasmion 500 ml	1 dialaflow
1 Mannitol	
1 flacon d'Eau Stérile 1 litre	
1 Flacon Nacl 0,9% 1 litre	

SERINGUES :

4 x 10 ml
4 x 20 ml
4 x 5 ml
4 x 2 ml
2 x 50 ml à vis
2 x 50 ml petit embout
2 x 1 ml
2 x 50 ml gros embout

Sonde de Salem 14-16-18-21 (*1 de chaque*)
1 Sonde de Blackmore

AIGUILLES :

10 x 18 G Pompeuses
5 x 21 G IM
5 x 23 G IV
5 x 25 G SC

PLATEAU PERFUSION / BILAN :



RANGEMENTS INFERIEURS :



TIROIR DE MEDICAMENTS D'URGENCES



MEDICAMENTS


SPECIALITE/ DOSAGE	CONDITIONNEMENT	QTE		PEREMPTION
Adrénaline 1 mg	ampoule 1 ml	10		
Adrénaline 5 mg	ampoule 5 ml	10		
Atropine 0,50 mg	ampoule 1 ml	6		
Anexate 0,50 mg	ampoule 5 ml	3		
Bricanyl 0,50 mg	ampoule 1 ml	4		
Cordarone 150 mg	ampoule 3ml	6		
Dobutrex 250 mg	flacon 20 ml	1		
Dopamine 200 mg	ampoule 5 ml	1		
Hydrocortisone 500 mg	flacon + solvant	1		
Hypnomidate 20 mg	ampoule 10 ml	3		
Hypnovel 5 mg	ampoule 1 ml	4		
Isoptine 5 mg	ampoule 2 ml	1		
Isuprel 0,2 mg	ampoule 1 ml	10		
Lasilix 20 mg	ampoule 2 ml	10		
Lénitral 15 mg	ampoule 10 ml	4		
Loxen 10 mg	ampoule 10 ml	4		
Natispray 0,3 mg	flacon	1		
Narcan 0,4 mg	ampoule 1 ml	5		
Pentothal 1 g	flacon	1		
Rivotril 1 mg	ampoule 2 ml	2		
Dexaméthasone 4 mg	ampoule 1 ml	2		
Striadyne 20 mg	ampoule 2 ml	5		
Valium 10 mg	ampoule 2 ml	5		
Ventoline spray	flacon	1		
Xylocaine 1 %	flacon	1		
Xylocaine 5 %	flacon nébuliseur	1		
Héparine 5 ml	flacon 25 000 u	1		
Glucose 30 %	ampoule 10 ml	3		
CACL ² 10 %	ampoule 10 ml	2		
MGSO ₄ 10 %	ampoule 10 ml	2		
KCL 10%	ampoule de 10 ml	2		

Péremption faite le :

par :

LE CHARIOT DE REANIMATION PEDIATRIQUE

Voici une présentation d'ensemble du chariot d'urgences pédiatriques nous verrons plus loin le détail de ses composants.



SUR LE COTE

- TIROIR 1 :** Ambu
Masque
Raccord O² monté
- TIROIR 2 :** Masque à ambu taille 0 – 2 – 3
+ 2 masques transparents
- TIROIR 3 :** Lunette O² x 1
Prolongateur O² x 2
Masque aérosol pédiatrique x 3
Sonde O² pédiatrique
- TIROIR 4 :** 1 Elohes 6 % de 500 ml
1 ringer lactate de 500 ml
1 plasmion de 500 ml
1 bicar 4,2 % de 500 ml
1 bicar 1,4 % de 250 ml



TIROIR 3

Seringues 50 ml à vis x 5

Seringues 50 ml gros embouts x 3

3 capuchons de transfert

Seringues 20 ml x 6

Seringues 10 ml x 6

Seringues 5 ml x 10

Seringues 1 ml x 5

Aiguilles 18 G pompeuses (roses) x 10

Aiguilles 21 G IM (vertes) x 10

Aiguilles 25 G SC (oranges) x 10

3 robinets

TIROIR 4

KIT VOIE CENTRALE :

Xylocaïne 1 %

Compresses stériles x 5

Champs troués x 2

1 seringue de 20 ml

1 paire de gants stériles n° 6,5 – 7,5 – 8,5 – 9

Hidibil x 2

1 kit vasculaire leaderflex G 17

1 multicath Vygon Fr 7,5

5 tubulures à perfusion avec robinet

5 raccords à SE

2 raccords SE + robinets

2 rampes 3 voies

TIROIR 5

Bandes crêpes 7 cm x 4
Américains non stériles x 2
Elasto 3 cm x 2
Champs troués x 5
3 poches à urines
1 peak flow pédiatrique + embout

DERRIERE EN HAUT

Sondes aspi Ch 6 – 10 – 12 (4 de chaque)