


## Sondage / SondageS

Nous présentons ici les résultats d'un sondage en ligne sur les pratiques infirmières en termes de drainage vésical.


Etude menée auprès de 1264 infirmières inscrites sur le site Infirmiers.com entre le 21/11 et le 21/12 2015.

(Taux de réponse =  $1264/95580 = 1,32\%$ )

## Lieu d'exercice



## Age




## POPULATION


Les sondé(e)s étaient majoritairement jeunes (72,8% avaient moins de 30 ans) et citadins (84%).

L'échantillon était principalement composé d'IDE employé(e)s de structures de soin (84%).

## Mode d'exercice




## Nombre de patients porteurs de SV vus/ mois



La population étudiée est habituée à la prise en charge des sondes vésicales : 59,4 % des IDE prennent en charge plus de 5 patients porteurs de sonde vésicale par mois.

Pour 17,2 % d'entr'elles/eux , ce soin est quotidien (plus de 20 par mois).


## Changez-vous les S.Urétrales de l'homme ?




Il semble admis par la plupart des IDE sondé(e)s de changer les sondes Urétrales. (plus de 80% le font)

En revanche, les cystocathéters à demeure n'entrent pas dans la pratique de routine, avec seulement 10% d'IDE réalisant les changements.


## Changez-vous les S.Urétrales de la femme ?



## Changez-vous les Cystocathéters à ballonnet?




## Raisons du refus de changer les sondes urétrales (N=301)



301 IDE ne changent pas les sondes urétrales. Pour 77% d'entr'elles/eux, la sécurité du patient est en jeu, par défaut d'apprentissage, d'habitude, d'asepsie ou de soutien.

La majorité des IDE ne réalisant pas les changements de SU pourrait donc réviser leur position, en améliorant par exemple l'enseignement du sondage urétral en IFSI/IFPS, en créant des ressources internet dont la forme reste à préciser.


## Le système clos est :



- Obligatoire
- Plus sûr pour éviter les infections
- Ennuyeux en cas de problème de sac car oblige à tout changer
- Difficile à trouver en pharmacie de ville


L'information concernant l'usage du système clos est bien passée, 91% des sondé(e)s le recommandent.

## La taille idéale d'une sonde chez l'homme ?




Si le choix du diamètre de la sonde est conditionné par la prescription, la lubrification n'est, elle, correcte que pour 60% des interrogé(e)s.

## Lubrification idéale du sondage urétral de l'homme ?




## Manoeuvres du pénis lors du sondage ?




Les manoeuvres péniennes semblent unanimement pratiquées, ou presque. Au contraire des pratiques de beaucoup d'urologues.

16% des interrogé(e)s utilisent du sérum physiologique pour le ballonnet. Le risque de cristallisation aboutissant à l'impossibilité de dégonfler est réel.

### Soluté de gonflage du ballonnet




### Sondage de l'homme : j'avance la sonde ... (%)




Près d'un tiers des sondé(e)s gonflent le ballonnet dès l'obtention d'urines. Le risque est de gonfler trop tôt (urèthre prostatique).

### A qui demandez-vous de l'aide en cas d'échec de pose ?




## Soins Locaux ?




Les soins locaux quotidiens eau et savon sont ici majoritaires. Rappelons que ce sont les seuls recommandés et sont réalisables par un certain nombre de patients eux-même.

## Produits / soins locaux (%)




## Changez-vous les poches de recueil ?




Ici, respect du système clos semble mis à mal avec seulement 38% des interrogé(e)s le respectant. Le « changement de sac si besoin » semble assez présente. Aucun autre schéma n'est actuellement validé. En cas de changement, 85% des IDE utilisent des poches stériles.


### Type de poches de recueil



### Souhaitez-vous de l'aide quant au drainage vésical ?



### Quelles formes d'aide ?



Les réponses à ce sondage témoignent de pratiques inégales et de doutes chez les IDE interrogé(e)s. Plus de trois quarts des IDE ayant participé souhaitent des informations, du soutien, quant au drainage vésical à domicile. Les cours magistraux « à l'ancienne » et les aides en ligne (disponibles, donc) sont les plus souhaités (36 % et 58 %, respectivement.)